

Anweisungskarten bei (Verdacht auf) Infektionen/Kolonisationen im Rettungsdienst

(zum Ausdrucken, Laminieren und im Einsatz mitführen)

1 symptombezogene Schutzmaßnahmen

Symptomatik	(Verdachts-)diagnose Übertragungsweg	Schutzmaßnahmen
Blutung	hämatogen	 
Durchfall	Enteritis Stuhlbezogen	  
Brechdurchfall	Noroviren stuhlbezogen/ aerosolgetragen	    
Erbrechen	Intoxikation	 
Blutige Expectoration	Lungen-TBC aerosolgetragen	    
Fieber	Unklarer Infekt mgl. aerosolgetragen	   
Fieber/ Kopfschmerz/ Nackensteifigkeit	Meningitis mgl. aerosolgetragen	    
(Kolonisation)	MRSA/MRE/Multi-re- sistenz mgl. aerosolgetragen	    
Schleimhautblutung/ Tropenaufenthalt	Hämorrhag. Fieber mgl. aerosolgetragen	    

*Die LARE (<https://www.lgl.bayern.de/gesundheits/hygiene/lare/merkblaetter/index.htm>) sieht im Rettungsdienst grundsätzlich als Atemschutz FFP2 vor. Im Verdacht auf virusbedingtes hämorrhagisches Fieber FFP3. Schuhüberzüge werden nicht mehr verwendet



Händedesinfektion



Handschuhe, Nitril ungepudert



Atemschutz FFP2*



Augenschutz



Flüssigkeitsdichte Schürze



Schutzanzug „Tyvek“



**Uhren/Ringe (auch Eheringe)/Schmuck (Naildesign)/Armbänder an
Händen und Unterarmen sind nach TRBA/BGR 250 nicht erlaubt!**

Glatter Nagellack ist davon im Rettungsdienst nicht betroffen.